

STK. AZTRIN D.S.
Ukuran : 128 x 36 mm

KETERANGAN :

 Pantone 184 C	 Pantone 294 C
 Pantone Yellow C	 Pantone 348 C
 Pantone Red 032 C	 Black

PRINT : 100%

KOMPOSISI :
AZTRIN® Sirup kering untuk suspensi oral mengandung Azithromycin dihydrate setara dengan 200 mg/5 ml Azithromycin setelah rekonstitusi dengan air.

REKONSTITUSI :

- Tambahkan 8 ml air kedalam botol sampai mendapatkan suspensi 15 ml.
- Kocok dengan baik.
- Setiap 5 ml suspensi mengandung 200 mg Azithromycin.

Serbuk seharusnya disimpan di bawah suhu 30°C. Rekonstitusi suspensi seharusnya disimpan di bawah suhu 30°C dan seharusnya digunakan dalam 5 hari setelah rekonstitusi.

Indikasi, Kontraindikasi, Peringatan dan Perhatian, Interaksi Obat, Efek Samping, Dosis dan Pemberian : lihat leaflet.

Aztrin®
Azithromycin
Dihydrate

Sirup Kering 200 mg/5 ml



HARUS DENGAN RESEP DOKTER
KOCOK DAHULU SEBELUM
DIGUNAKAN

No. Reg. DKL1021638138A1

Area Unvernish
40 x 11 mm

Diproduksi oleh :

 PHAROS
Jakarta - Indonesia

055374 - 1 A 3

PRINT : 150%

KOMPOSISI :
AZTRIN® Sirup kering untuk suspensi oral mengandung Azithromycin dihydrate setara dengan 200 mg/5 ml Azithromycin setelah rekonstitusi dengan air.

REKONSTITUSI :

- Tambahkan 8 ml air kedalam botol sampai mendapatkan suspensi 15 ml.
- Kocok dengan baik.
- Setiap 5 ml suspensi mengandung 200 mg Azithromycin.

Serbuk seharusnya disimpan di bawah suhu 30°C. Rekonstitusi suspensi seharusnya disimpan di bawah suhu 30°C dan seharusnya digunakan dalam 5 hari setelah rekonstitusi.

Indikasi, Kontraindikasi, Peringatan dan Perhatian, Interaksi Obat, Efek Samping, Dosis dan Pemberian : lihat leaflet.

Aztrin®
Azithromycin
Dihydrate

Sirup Kering 200 mg/5 ml



HARUS DENGAN RESEP DOKTER
KOCOK DAHULU SEBELUM
DIGUNAKAN

No. Reg. DKL1021638138A1

Area Unvernish
40 x 11 mm

Diproduksi oleh :

 PHAROS
Jakarta - Indonesia

055374 - 1 A 3